

Educación sobre el Desfibrilador Cardioversor Implantable (ICD)



Desfibrilador Implantable (ICD)

Su médico le ha indicado que necesita un Desfibrilador Cardioversor Implantable (ICD). Esta guía educativa ayudará a comunicar lo que sucederá antes, durante y después de su procedimiento. Fue escrito para informarle sobre su procedimiento y responder a las preguntas más frecuentes.

¿Qué es un Desfibrilador Automático Implantable?

Un ICD generalmente se implanta cuando un problema eléctrico en el corazón resulta en un ritmo cardíaco rápido y potencialmente mortal. El ICD monitorea su frecuencia y ritmo cardíaco. Si su corazón comienza a latir rápidamente o tiene un ritmo potencialmente mortal, el ICD administra una descarga eléctrica para convertir (cambiar) su ritmo a un ritmo normal.

Se hace una pequeña incisión en el sitio de la implantación. Esto suele ser justo debajo de la clavícula. Los cables se colocan a través de esta incisión hasta el corazón.



Preparación

Recibirá una llamada telefónica recordándole de su procedimiento. Asegúrese de preguntar cualquier duda que tenga cuando alguien de nuestra oficina lo llame. **¿Qué hago antes de mi procedimiento?**

- Deberá ayunar (nada de comer o tomar) para este procedimiento, siga las instrucciones en el documento que recibió para su procedimiento.
- Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento y permanezca con usted durante las próximas 24 horas.
- Consulte las instrucciones en el documento que recibió antes de su procedimiento para la hora de llegada y horario del procedimiento.
- Bañarse con jabón antibacterial o un jabón especial la noche anterior y también en la mañana de su procedimiento. Siga las instrucciones que se le han dado.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original

Medicaciones

- Es muy importante que siga las instrucciones de medicamento, proporcionadas por su médico antes del procedimiento. Le recordaremos esto durante una llamada telefónica previa al procedimiento.
- Por favor, prepare una lista actualizada de sus medicamentos para llevar con usted el día de su procedimiento.

Día del procedimiento

¿Qué hago en el día de mi procedimiento?

- No se ponga maquillaje, cremas, desodorante o productos para el cabello en este día.
- Deje objetos de valor y joyas en su casa.
- Cuando llegue, simplemente regístrese en la recepción del primer piso.
- Despues de registrarse usted será llevado a una habitación donde una enfermera lo preparará para el procedimiento.

Anestesia

¿Tendré anestesia? Sí

Durante el procedimiento, se le administrarán medicamentos por vía intravenosa que le darán sueño, o recibirá anestesia general, medicamento que le permite dormir durante la cirugía. Dependiendo del tipo de sedación que reciba, un médico o una enfermera lo vigilarán de cerca.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia?

- Equilibrio deficiente
- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Deterioro del juicio durante un máximo de 24 horas
- Dificultad para recordar
- Náuseas

Después del procedimiento

¿Qué debo esperar después de mi procedimiento?

- Una vez que se complete el procedimiento, regresará a una habitación para la recuperación. Una enfermera supervisará su recuperación.
- Prepárese para pasar la noche en el hospital, sin embargo, existe la posibilidad de que pueda irse a casa de 4 a 6 horas después del procedimiento.
- Usted se irá a casa con un apósito sobre la incisión. Antes de que le den el alta, le proporcionaremos instrucciones por escrito y le informaremos cuándo retirar el apósito y cómo cuidar la incisión.
- Su enfermera le proporcionará instrucciones escritas de alta y responderá todas sus preguntas antes de enviarlo a casa.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original

Si experimenta:

- **Dolor** - En casa puede experimentar molestias leves y / o moretones en el sitio de la incisión. Esto generalmente se maneja con analgésicos de venta libre y / o compresiones de hielo.
- **Sangrado inesperado** - El sangrado excesivo o el líquido que se empapa a través del apósito no es normal. Póngase en contacto con el operador de su médico.
- **Náusea o vomito** - Comience con sorbos de líquidos claros en pequeñas cantidades. Una vez que tolere los líquidos claros, debe agregar lentamente otras opciones de alimentos suaves y bajos en grasa, aumentando gradualmente a su dieta normal.
- **Señales de Infección** - Llame a su médico si tiene fiebre de más de 101 grados, aumento del enrojecimiento, hinchazón o calor en el sitio de la incisión.

Fecha y Versión #	Cambiar Resumen
10/03/2022 Ver. 1	Original